

Sukces Hodowcy

NEWS

TEMAT NA CZASIE

Zakwaszanie mleka

Zakwaszanie mleka podstawą bezpiecznego żywienia cieląt

Korzyści wynikające z zakwaszania mleka:

- Konserwacja pójła mlecznego
- Mniejsze ryzyko zasiedlenia przewodu pokarmowego chorobotwórczymi bakteriami (Coli)
- Pozytywne oddziaływanie na trawienie
- Mniej biegunek
- Żywniejsze i zdrowsze cielęta

Zaopatrzenie cieląt ma decydujące znaczenie dla ich późniejszej wydajności, szczególnie w przypadku rasy bydła mlecznego lub mięsnego. Zakwaszenie mleka zapewnia poprawę higieny paszy i stabilniejsze trawienie. Niższe wartości pH redukują zasiedlenie mleka bakteriami chorobotwórczymi, a to zapobiega wystąpieniu ryzyka biegunek. Ponadto zakwaszenie przyspiesza ścinanie się kazeiny w trawieńcu, co sprzyja stabilności pracy jelit.

ZAKWASZENIE PÓJŁA ZAPOBIEGA BIEGUNKOM



TEMAT NA CZASIE

Tak to się robi:

- Przygotuj roztwór kwasu w kanistrze (np. SCHAUMACID DRINK C: 1 część kwasu, 9 części wody)
- Pierwszego dnia podaj jak zwykle dawkę siary, od drugiego dnia rozpocznij delikatne zakwaszanie siary (10 ml roztworu/ litr)
- Przez kolejne tygodnie aplikuj gotowy roztwór wg tabeli dozowania (tab. 1)
- Przy standardowym stosowaniu zaleca się dozowanie w ilości 15 ml roztworu kwasu/ litr mleka
- Mleko nie powinno się ściąć, ale może przyjąć konsystencję jogurtu
- Zakwaszenie mleka pełnego znajduje swoje przeznaczenie zarówno w klasycznym odpajaniu cieląt, jak i w pojeniu do woli

1 Dozowanie SCHAUMACID-u DRINK C z mlekiem pełnym

Dozowanie SCHAUMACID-u DRINK C w ml/l mleka pełnego	Dozowanie gotowego roztworu w ml/l mleka pełnego	Wartość pH pójła	Temperatura pójła
1 ml	10 ml	6,15	38°C
2 ml	20 ml	5,65	35°C
3 ml	30 ml	5,35	<30°C
4 ml	40 ml	5,1	20-25°C

Dodatkowe zalecenia:

- Zastosuj KALBI-PHOSPHORAL jako uzupełnienie mleka pełnego (60 g/ cielę dziennie)
- W czwartym tygodniu zredukuj ilość pójła do ok. 8 l, aby w ten sposób zachęcić cielęta do pobierania paszy objętościowej i paszy treściwej
- Wprowadź KALBI TMR ALFA dla uzyskania wczesnego poboru paszy
- Koniecznie zapewnij świeżą wodę do picia

2 Plan pojenia i skarmiania na odchów cieląt płci żeńskiej

