

Sukces Hodowcy

NEWS

TEMAT NA CZASIE Niedobór paszy

Zabraknie kiszonki z traw

Już teraz należy podjąć decyzję dotyczącą dawek dla zwierząt

W wielu regionach, z powodu suszy, zebrano mało traw na kiszonkę. Niedobór paszy objętościowej będzie odczuwalny jesienią i zimą. Już teraz ułóż wspólnie z doradcą firmy Schaumann dawki dla Twojego stada.

Mimo słabego zbioru traw, zwierzęta muszą być odpowiednio odżywione. Gdy brakuje traw, brakuje przede wszystkim białka surowego. Stąd konieczność skutecznego uzupełnienia dawek ubogich w trawy w szybko rozkładalne białko albo mocznik paszowy, aby nie dopuścić do ujemnego bilansu azotu w żwaczku.

Alternatywna pasza

Dwie różne strategie żywieniowe bazujące na miejscowej dostępności komponentów, pozwalają zastąpić kiszonkę z traw. **Rysunek 1** przedstawia możliwości zastąpienia kiszonki z traw w dawkach. Aby znaleźć sensowne

1 Możliwość zastąpienia 10 kg kiszonki z traw (34% SM; 6,2 MJ; 135 g nXP)

Alternatywa	Siano 2,5 kg Jęczmień 0,8 kg Poekstrakcyjna śruta rzepakowa 0,4 kg Mocznik 20 g	Słoma 1,5 kg Kukurydza na ziarno 1,2 kg Poekstrakcyjna śruta rzepakowa 0,8 kg Mocznik 20 g
SM/zwierzę/dzień kg	3,2	3,1
nXP g/kg SM	148	150
NEL MJ/kg SM	6,3	6,2

Działać przewidywalnie i zaopatrywać zgodnie z zapotrzebowaniem

TEMAT NA CZASIE Niedobór paszy

Zabraknie kiszonki z traw

Już teraz należy podjąć decyzję dotyczącą dawek dla zwierząt

rozwiązanie, pozwalające uniknąć spadku wydajności, należy przeprowadzić analizę dokupu produktów ubocznych i dostępnych kiszonek.

Zaopatrzenie we włókno

Żywnienie krowy oznacza żywienie jej żwacza. Ta zasada zyskuje na znaczeniu szczególnie w sytuacji niedoboru paszy. Słoma lub siano (siano z lucerny) w kombinacji z paszą treściwą i produktami ubocznymi mogą częściowo zastąpić kiszonkę w dawce. W przypadku wszystkich komponentów zawierających włókno ważne jest, by ich jakość była nienaganna pod względem higieny. Należy zwrócić również uwagę na ilość suchej masy w dawce i tym samym zapobiec sortowaniu paszy.

Uzupełnienie białka

Oprócz powszechnie stosowanych pasz białkowych jak poekstrakcyjna śruta sojowa i rzepakowa, można wykorzystać w żywieniu zwierząt inne produkty takie jak rośliny

strączkowe. Trzeba być jednak szybkim! Młóto browarniane jest na przykład dostępne w ograniczonej ilości i należy możliwie wcześnie określić źródło dostawy. Jeżeli istnieje konieczność dodania mocznika, warto pamiętać, że znajduje się on w produktach Rindaspezial, linii oferującej kompleks składników mineralnych i substancji czynnych.

Poprawa strawności

Warunkiem optymalnego wykorzystania małej ilości paszy objętościowej i innych komponentów, np. słomy, jest wysoka strawność dawki

pokarmowej. Poprawę strawności wszystkich składników pomogą nam uzyskać produkty zawierające Rumivital / Rumivital i. Ta innowacyjna substancja czynna poprawia dostępność włókna surowego i optymalizuje wykorzystanie skrobi dla większej efektywności paszy (rys. 2).

Konieczna przezorność


Dzięki ustaleniu z odpowiednim wyprzedzeniem strategii żywieniowej można uniknąć negatywnych następstw związanych z niedoborem paszy objętościowej lub częściowo je wyrównać.

2 RUMIVITAL zwiększa strawność dawki i tym samym wydajność mleczną (wyniki centrum naukowo-badawczego Gut Hülseberg)

Okres doświadczenia	2 x 8 tygodni (doświadczenie krzyżowe)
Liczba zwierząt	2 x 60 zwierząt
Ø Wydajność mleczna	34,5 kg/dzień

Strawność poszczególnych parametrów

Względna poprawa strawności (%) elementów szkieletowych roślin i masy organicznej w dawce ogółem z RUMIVITAL



Doradca SCHAUMANN-a pomoże w ułożeniu dawki.

Zareaguj już teraz!